

## PREE の使用上の注意

### Scoring 方法

痛み (PREE-P) は合計 50 点、機能は特定の動作 (PREE-SF) 合計 110 点と通常の動作 (PREE-UF) 合計 40 点で表記され、機能全体 (PREE-F) としては特定の動作と通常の動作の合計を 3 で割った値 (50 点満点) です。また PREE 総合点は 痛みと機能の合計で 100 点になります。

### スコアリングに関してよくある質問

#### 1) 欠損データはどのように取り扱いますか？

欠損データは各サブスケール (PRWE-P, PRWE-F) で 1 項目のみ認められます。欠損項目はサブスケールの平均スコアに置き換えます。

#### 2) 動作がまったくできないために、その質問項目を空白にしている場合はどうしますか？

その項目には「10」と回答すべきだと患者に教えてください。必要があれば訂正してください。

#### 3) もし患者がめったにしない動作ならどうしますか？

患者がめったにしない動作に対してどう回答するか迷っている場合は、平均するとどの程度困難か予測してもらってください。予測してもらうほうが質問に回答しないよりも正確になります。

#### 4) 患者がその動作をしていない場合はどうしますか？

患者が一度もその動作をしていなければ、質問は空白のままにしてください。

#### 5) 2つ以上に○がついている場合はどうしますか？

回答の平均をとってください。